

Azúcares, Aminoácidos y Vitamina B1.

REGENERADOR Y PROTECTOR DEL PARÉNQUIMA Y FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO.

DESCRIPCIÓN:

Elevadas concentraciones de azúcares de alta y rápida metabolización, con directo accionar sobre la célula hepática (hepatocito). Más Metionina y vitamina B1, de probados efectos regeneradores del tejido y parénquima del "órgano filtro y depurador del metabolismo".

INDICACIONES:

Principales: Tratamiento de alteraciones hepáticas de cualquier origen: infecciones bacterianas, víricas, parasitarias (distomatosis, anaplasmosis), metabólicas (cetosis acetoneamia), tóxicas o desbalances nutricionales.

Complementarias: Recupera al animal de los excesos y desbalances nutricionales por modificaciones en la ración, exceso de proteínas (edema de ubre), déficit de energía (hígado graso, cetosis), alteración en el metabolismo de los carbohidratos.

• Estabiliza y desintoxica el sistema hepato-pancreático, devolviendo al animal su condición productiva. En vacas lecheras de alta producción, son frecuentes los casos de acidosis. También se observan vacas caídas por acetoneamia, procesos de intoxicación hepática por excesos de proteínas ó glúcidos. Es imprescindible prevenir estos casos, pues afectan no sólo la producción láctea, sino que ponen en peligro la vida de nuestras mejores vacas.

Indicado en todo grupo de animales afectados por Hematozoarios (Anaplasmosis; Babesiosis y Tripanosomosis) como adyuvante en el tratamiento de recuperación de la forma clínica de la enfermedad.

PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla de 500 ml,
250 ml y 100 ml.



DOSIFICACIÓN:

TRATAMIENTO PREVENTIVO:
1 ml c/50 kg. Pv, repetir a la semana.
TRATAMIENTO DE URGENCIA:
Bovinos 2,5 ml c/10 kg. PV
Ovinos y Caprinos 0,6 ml c/10 kg PV
Porcinos 0,6 ml c/ 10 kg PV
Equinos 0,6 ml c/ 10 kg PV

VÍA DE APLICACIÓN:

Hepatoprotector es un inyectable listo para su uso. Se aplica por vía intramuscular profunda o vía endovenosa lenta, debiendo seguirse las normas elementales de seguridad y asepsia en la aplicación de este producto.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES:

Las dosis indicadas podrán repetirse cada 24 hs hasta la recuperación del animal.
Continuar el tratamiento hasta desaparición de los síntomas.
En forma preventiva cuando se sospeche de efectos nocivos en el parto, aplicar 15 días antes de la fecha probable de parto, repitiendo a la semana ante parto y a los dos días posteriores a producirse el mismo.

FÓRMULA:

Activos:

Sorbitol 22.00 g
DL Metionina 4.00 g
Tiamina HCl 0.50 g
Agua bidestilada
apirógena estéril csp100.00 ml

