

FICHA TECNICA DE QUOTRAX

Indicaciones:

Para el tratamiento de las enfermedades infecciosas de los bovinos, equinos, caprinos, porcinos, caninos, ovinos y aves, ocasionados por gérmenes tales como: Streptococosis, Estafilococosis, Neumonías Bronquitis, Mastitis, Leptospirosis, Pasteurellosis ó Septicemia hemorrágica, Actinomicosis Actinobacilosis, Colibacilosis, Carbón bacteridiano, Carbón sintomático, Vibriosis bovina, Disentería vibriónica, Artritis, Hemoglobinuria bacilar, Edema maligno, Tétano, Erisipela Listeriosis, Adenitis, Pododermatitis infecciosa, Vaginitis, Metritis, Nefritis, Pielonefritis, Cistitis, Abscesos, Necrobacilosis, Infecciones cutáneas y pódales, Enterotoxemias; En aves: Colera Aviar, Coriza infecciosa, E. coli.

Composición:

Cada ml contiene:

Diclofenaco sódico.....0,0625 mg
Penicilina G Sódica4.000.000 UI
Penicilina G Procaínica4.000.000 UI
Sulfato de Dihidro estreptomina5 g

Dosis y administración:

Vía Intramuscular profunda exclusivamente

Las penicilinas se dosifican entre 10.000 y 22.000 U.I./kg de peso vivo cada 12 a 24 horas por 3 a 7 días.

La Estreptomina se dosifica en un rango de 10 a 20 mg/kg de peso vivo.

En la práctica 1mL por cada 20 kilos de peso cada 12 a 24 horas o 3 ml por cada 50 - 100 kg de peso vivo cada 12 a 24 horas

Tratamiento de 3 a 5 días consecutivos

(Después de reconstituir dura 30 días bajo refrigeración)